

PLANTES NOUVELLES OU CRITIQUES DES SERRES DU MUSÉUM,

PAR M. A. GUILLAUMIN.

59. **Perrierastrum oreophilum** Guillaum. gen. et sp. nov.

Frutex 1-3 m. altus, radicibus crassis, ramis sal gracilibus griseo-fulvo velutinis, foliis caducis, sal carnosis, odoratis, citrum medicum olentibus, supra atro viridibus, infra pallidis glandulisque valde numerosis notatis, petiolo 1-3 cm. longo, abunde griseo velutino, rachi nervisque abunde griseo velutinis, lamina sparse griseo tomentosa, inferioribus 2 pinnatis, ad 7 cm. \times 6 mm. et ultra, primarum usque ad 5 jugis et terminali, jugis inferioribus usque ad nervum decompositis, segmentis 3-4 basitaribus usque ad nervum separatis, atis terminalique profunde incisis, foliis superioribus sensim integrioribus; inflorescentia terminalis, laxe racemosa, usque ad 15 cm. alta, leviter pyramidalis, floribus albis, 8-12-nis, axi lanuginoso, bracteis ovato-triangularibus, inferioribus ad 8 mm. \times 6 mm., apicem versus sensim minoribus, sessilibus, infra in costa parce villosis, pedicellis ad 7 mm. longis, lanuginosis, maturitate patule erectis, calice 5 mm. longo, oblique campanulato, glabro, basin versus valde glanduloso, nervis reticulatis prominentibusque, 5 lobo, lobo superiore majore, ovato, erecto, convexo, rotundato, atis valde acutis, lateralibus inferioribus leviter brevioribus, corolla 1 cm. longa, tubo 2 mm. longo, lobis basilaribus mediisque reflexis, basilaribus longioribus, intus glabris, extra villosis glandulosisque, lobo terminali concavo, naviculari, intus glabro, extra, marginibus exceptis, villoso glandulosoque, 5 mm. longo, staminibus 4, corolla leviter longioribus, filamentis liberis, æqualibus, antheris confluentibus, stylo corolla æquilongo, apice vix 2 lobo, disco annulari, undulato, ovario glabro; calice fructifero fere horizontali, usque ad 1 cm. longo, seminibus nigris, levibus.

Madagascar : Massif d'Andringitra, entre 1.600 et 2.000 mètres, rocailles (*Perrier de la Bâthie*, 13729), versant est entre 1.800 et 2.000 mètres, rocailles (*Perrier de la Bâthie*, 14443), Morombé, 1.300 mètres, rocailles à xérophytes (*Perrier de la Bâthie*, 17681), floraison en février; 1^{re} floraison dans les serres du Muséum en

octobre 1930. (*Perrier de la Bâthie*, F. 172, 1921), mais les fleurs ne se développent pas complètement.

Bien que voisine des *Anisochilus* (Ocimoïdées-Plectranthees), cette plante ne saurait être rattachée à ce genre à cause du calice tout différent qui ressemble à celui d'un *Ocimum* et par la corolle qui ne présente aucun renflement à la base.